



RACCOMANDAZIONI PER LA FREQUENZA AL NIDO

Quando frequentano una comunità i bambini, soprattutto i più piccoli, sono maggiormente esposti al rischio di infezione e di maggiore gravità della malattia.

In generale non è richiesto l'allontanamento dalla comunità in occasione di malattie lievi, come banali infezioni respiratorie, in quanto a trasmissione è probabilmente già avvenuta prima della manifestazione dei sintomi oppure è trasmessa da bambini con infezioni asintomatiche.

E' necessario che il bambino NON frequenti il nido se presenta:

- Una malattia che gli impedisca di partecipare adeguatamente alle attività
- Una malattia che richieda cure che il personale non è in grado di offrire
- Febbre, irritabilità, pianto persistente, difficoltà respiratorie o altri segni di malattia grave.
- Diarrea, vomito.
- Stomatite aftosa (presenza di vescicole di colore grigio-giallastro in bocca) fino a che il pediatra stabilisca che la condizione non è infettiva.
- Congiuntivite purulenta (secrezioni bianca o gialla dall'occhio, spesso con palpebre appiccicose al risveglio).
- Rash (esantema, arrossamento della pelle) con o senza febbre, fino a che il pediatra non determini che la malattia non è infettiva.
- Faringite/Tonsillite (intenso arrossamento della gola con eventuale formazione di placche di colore grigio-giallastro).
- Pediculosi.